

Riepilogo nazionale e regionale antivirali per COVID-19 (periodo: apertura monitoraggio – 19 gennaio 2022)*

Regione	Trattamenti avviati per pazienti ospedalizzati		Trattamenti avviati per pazienti non ospedalizzati				
	Remdesivir	Inc%	Remdesivir	Molnupiravir	Totale per regione	Remdesivir %	Molnupiravir %
Abruzzo	2.343	3,0%	27	23	50	3,0%	1,5%
Basilicata	927	1,2%	-	-	-	0,0%	0,0%
Calabria	1.797	2,3%	-	-	-	0,0%	0,0%
Campania	3.289	4,1%	20	12	32	2,2%	0,8%
Emilia Romagna	7.945	10,0%	244	17	261	27,1%	1,1%
Friuli Venezia Giulia	1.063	1,3%	11	59	70	1,2%	4,0%
Lazio	11.206	14,1%	63	219	282	7,0%	14,7%
Liguria	5.332	6,7%	87	207	294	9,7%	13,9%
Lombardia	12.089	15,3%	239	114	353	26,5%	7,6%
Marche	3.739	4,7%	10	85	95	1,1%	5,7%
Molise	42	0,1%	-	5	5	0,0%	0,3%
Piemonte	5.593	7,1%	50	203	253	5,5%	13,6%
Prov. Auton. Bolzano	188	0,2%	-	11	11	0,0%	0,7%
Prov. Auton. Trento	211	0,3%	-	3	3	0,0%	0,2%
Puglia	4.439	5,6%	13	66	79	1,4%	4,4%
Sardegna	757	1,0%	-	29	29	0,0%	1,9%
Sicilia	4.383	5,5%	2	30	32	0,2%	2,0%
Toscana	5.916	7,5%	106	161	267	11,8%	10,8%
Umbria	1.583	2,0%	9	42	51	1,0%	2,8%
Valle D'aosta	351	0,4%	-	20	20	0,0%	1,3%
Veneto	6.072	7,7%	20	186	206	2,2%	12,5%
Italia	79.265	100,0%	901	1.492	2.393	37,7%	62,3%